

# Beginn der Therapie und Erreichen der optimalen Dosis (Kurzprotokoll)\*

## Die Therapie beginnt mit

**abnobaVISCUM 0,02 mg, 1 ml (= 1 Ampulle)**  
**3 x wöchentlich s.c. über 2 1/2 Wochen - insgesamt 8 Ampullen (= 1 Packung)**

Jede einzelne der Reaktion 1-3 zeigt eine optimale Dosis an:

- 1 Lokale Entzündungsreaktion am Injektionsort bis Ø = 5 cm.
- 2 Vorübergehender Temperaturanstieg innerhalb von 12 Stunden nach der Injektion um 0,5° bis 1,0° C.
- 3 Änderung des subjektiven Befindens: Schmerzlinderung, tieferer Schlaf, besserer Appetit.

**Die genannten Reaktionen 1 und 2 verlieren nach 2 1/2 Wochen an Intensität (wenn nicht, weitere 2 1/2 Wochen mit 0,02 mg dosieren). Dann erfolgt eine Steigerung auf die nächst stärkere Dosis.**

Am Injektionstag auftretende Abgeschlagenheit, leichtes Frösteln, allgemeines Krankheitsgefühl, Kopfschmerz oder kurzzeitige Schwindelgefühle sind ebenfalls Zeichen einer richtigen Dosierung, wenn diese Reaktionen innerhalb von 12 Stunden wieder abklingen.

**abnobaVISCUM 0,2 mg, 1 ml (= 1 Ampulle)**  
**3 x wöchentlich s.c. über 2 1/2 Wochen**

Regelmäßig werden erneut die Reaktionen 1-3 auftreten. Bei zu starken Reaktionen verfahren Sie bitte nach der nebenstehenden Empfehlung zum Vorgehen bei Überdosierung.

**entweder** Bei guter Verträglichkeit und erneuter Abnahme der Intensität der Reaktionen 1-3 wird bei gutem Allgemeinbefinden erneut nach 2 1/2 Wochen die Dosis gesteigert auf

**abnobaVISCUM 2 mg, 1 ml (= 1 Ampulle)**  
**3 x wöchentlich s.c. beibehalten und als Dauertherapie fortführen.**

Damit ist eine individuell optimale Dosis für die Dauertherapie erreicht.

**oder** Bei schlechtem Allgemeinbefinden oder empfindlich reagierenden Patienten wird die bereits erreichte Dosis beibehalten

**abnobaVISCUM 0,2 mg, 1 ml (= 1 Ampulle)**  
**3 x wöchentlich s.c. beibehalten und als Dauertherapie fortführen.**

Damit ist eine individuell optimale Dosis für die Dauertherapie erreicht.

### Woche 1 - 3

Beispiel:

Woche 1 Mo. Mi. Fr.

Woche 2 Mo. Mi. Fr.

Woche 3 Mo. Mi.

### Woche 3 - 6

### Woche 6 und folgende

### Woche 6 und folgende

## Eine zu hohe Dosierung liegt vor, wenn:

Die lokale Entzündungsreaktion größer als 5 und kleiner als 10 cm Ø ist:  
 In diesem Fall sollte für die nächsten 3 Injektionen die Menge auf 0,5 ml (1/2 Ampulle) reduziert werden.

Die lokale Entzündungsreaktion größer als 10 cm Ø ist:  
 In diesem Fall wird für 2 1/2 Wochen (8 Ampullen) die nächst niedrigere Stärke injiziert.

Bei anhaltender Schwäche, Übelkeit und /oder Schwindel:  
 In diesem Fall wird für 2 1/2 Wochen die nächst niedrigere Stärke injiziert.

**Bei dauerhaft zu starken Reaktionen und Nebenwirkungen** auf die Injektion sollte die Therapie mit 8 Ampullen abnobaVISCUM in der Potenzstufe D6 desselben Wirtsbaumes weitergeführt werden.

## Dauertherapie

Regelmäßig wird nach Erreichen der individuell optimalen Dosis für die Dauertherapie ab Woche 6 wie folgt verfahren:

Die 3 x wöchentlichen Injektionen werden über einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren beibehalten. Danach wird 2 x wöchentlich für die Dauer von einem Jahr injiziert.

Nach 3 Jahren Therapie können Pausen von 3 Monaten eingelegt werden.

**CAVE:** Nach Pausen von länger als 4 Wochen muss wie bei Therapiebeginn wieder mit einer geringen Dosis (0,02 mg) begonnen werden.

\* Eine ausführliche Beschreibung finden Sie in der Fachinformation, in den Anwendungs-Empfehlungen zu abnobaVISCUM und auf der Homepage ( www.abnoba.de ) unter 'Fachkreisinformationen'.