

## Prospecto

# Betula Folium D3 ABNOBA

Principio activo: Betula pendula e foliis rec. col. dil. D3

Medicamento homeopático para la terapia de orientación antroposófica.

### **Composición:**

1 ampolla contiene como principio activo:  
Betula pendula e foliis rec. col. dil. D3 (Farmacopea Homeopática Alemana, v. 32) 1ml.

### **Isotonizante:**

Monohidrógenofosfato sódico dihidrato, ácido ascórbico

### **Nombre y dirección de la empresa farmacéutica y fabricante:**

ABNOBA GmbH  
Hohenzollernstr. 16, 75177 Pforzheim  
[Alemania]

### **Forma farmacéutica, contenido y tamaño del envase:**

Dilución líquida para inyección  
Ampolla de 1 ml:  
Embalaje original con 8 ampollas  
Embalaje original con 48 ampollas

### **Campo de aplicación:**

Medicamento homeopático registrado, por ello no contiene información sobre su indicación terapéutica.

### **Nº Reg. 31698.00.00**

### **Indicación para el usuario:**

Consulte a su médico en caso de que persistan los síntomas de la enfermedad durante la utilización de este medicamento.

### **Contraindicaciones:**

No usar si existe una alergia conocida al extracto de hojas de abedul.

### **Medidas de precaución:**

Consulte a su médico antes de tomar cualquier medicamento durante el embarazo y la lactancia.

No existen suficientes experiencias clínicas documentadas acerca del uso de este medicamento en niños y adolescentes. Por lo tanto, no debe usarse en niños ni adolescentes menores de 18 años sin previa consulta al médico.

**Interacción con otras sustancias:** ninguna conocida

**Advertencias:** ninguna

### **Dosificación y forma de uso:**

A menos que se haya prescrito algo diferente, al comienzo del tratamiento en adultos aplicar 0,25 ml de solución inyectable vía subcutánea; según el caso, cerca de la zona afectada. Dependiendo de la reacción local observada, se aumentará la dosis lentamente

hasta 2 ml. Esta dosis puede ser aplicada en varios sitios. La siguiente inyección se realiza, por lo general, después de tres días. La reacción local y el posible aumento de temperatura deben haber disminuido. Queda a discreción del médico tratante decidir por cuánto tiempo se empleará el medicamento.

En cuanto a la dosificación en niños y adolescentes, no existen suficientes experiencias clínicas documentadas. En caso de aplicación en niños y adolescentes, la dosificación deberá ser determinada por el médico.

Una vez abiertas, las ampollas deberán usarse inmediatamente. Las ampollas abiertas no pueden ser conservadas para ser usadas en otro momento ya que pierden la esterilidad.

**Efectos secundarios:**

Entre los efectos secundarios se consideran tolerables un leve ardor durante la inyección, enrojecimiento e induración (endurecimiento del tejido) de hasta 3 cm de diámetro, acompañados de leve dolor local. Estas reacciones locales deben disminuir después de 72 horas. El aumento de la temperatura corporal hasta 1,0 °C y el aumento de la diuresis (eliminación de orina) son efectos esperados que muestran la capacidad de reacción del paciente.

Consulte a su médico o farmacéutico en caso de que observe efectos secundarios no mencionados en este prospecto.

**Conservación del medicamento:**

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.  
No conservar a temperaturas superiores a 25 °C.

**Indicaciones y datos sobre la caducidad del medicamento:**

Este medicamento no puede ser aplicado una vez vencida la fecha de caducidad.

Última actualización: octubre del 2010

Venta permitida solo en la farmacia

**ABNOBA**

Hohenzollernstr. 16, 75177 Pforzheim – Alemania.  
Tel.: +49(0)7231-316478, Fax +49(0)7231-358714