

ANWENDUNG

Zu Beginn der Behandlung werden 0,25ml Injektionslösung subcutan, möglichst in die Nähe des Erkrankungsortes injiziert.¹⁾

Nach der Injektion kann es am Injektionsort zu einem leichten Brennen kommen. Ebenso können als lokale Reaktion Rötungen und leichte Gewebeerhärtungen auftreten, welche jedoch bis zu einem Durchmesser von 3 cm tolerierbar sind. Sie sollten allerdings nach 3 Tagen abgeklungen sein. Eine Anhebung der Körpertemperatur um bis zu 1° C sowie vermehrte Diurese sind erwünscht und zeigen eine therapeutische Reaktion an.

Abhängig von der lokalen Reaktion wird die Dosis langsam auf 2 ml gesteigert. Dabei kann die Dosis auch auf mehrere Injektionsstellen verteilt werden. Regelmäßig erfolgt die nächste Injektion nach drei Tagen. Die lokale Reaktion und eine eventuell auftretende leichte Temperaturerhöhung sollte vor der jeweils folgenden Applikation von Betula Folium abgeklungen sein.

Bei bekannter Allergie gegen Birkenblätterextrakte darf Betula Folium nicht angewandt werden.

Betula Folium D3 ABNOBA Injektionslösung ist in Packungsgrößen zu 8 und 48 Ampullen zu 1 ml erhältlich.

Therapieinformation 0800 22 66 222

¹⁾ Der Rest der 1ml Ampulle ist zu vernichten.

ABNOBA GmbH

Allmendstraße 55 · 75223 Niefern-Öschelbronn
Telefon 07233. 7043-200 · Telefax 07233. 7043-301 · eMail: info@abnoba.de · www.abnoba.de

Rheumatoide Arthritis



Betula Folium D3

NEU:
Betula Folium
ist ab sofort auch
in den Verdünnungen
D6, D12 und D20
lieferbar.



ABNOBA

Bitte
ausreichend
frankieren

ABNOBA GmbH
Allmendstraße 55
75223 Niefern-Öschelbronn

Musteranforderung

Telefax 07233. 7043 – 301
eMail: info@abnoba.de
www.abnoba.de
Therapieinformation 0800 22 66 222

BESCHREIBUNG

Betula Folium

Betula Folium D3 ABNOBA, wird als Kolloid-Präparation aus jungen, frischen Birkenblättern gewonnen. Eine Ampulle (1ml) enthält 1,88 mg frischen Pflanzenextrakt.¹⁾

Therapeutisch wird Betula Folium D3 erfolgreich eingesetzt bei Patienten mit:

**chronischer Polyarthritis,
rheumatischer Monoarthritis
und aktivierten Arthrosen.**

Das Arzneimittel Betula Folium D3 ABNOBA unterliegt nicht der Aut Idem-Regelung.



ABNOBA GmbH

SELEKTIVE HEMMUNG AKTIVIERTER LYMPHOZYTEN

Die aus der traditionellen Anwendung von Birkenblättern bekannte lindernde Wirkung wird durch neuere präklinische Untersuchungen bestätigt:

Eine Methotrexat und Birkenblätterextrakt vergleichende Untersuchung an der Universität Freiburg¹⁾ stellt dazu zusammenfassend fest:

Die Extrakte von Betula pendula-Blättern hemmten dosisabhängig und signifikant das Wachstum und die Teilung von aktivierten T-Lymphozyten, nicht jedoch die der ruhenden T-Lymphozyten. Die Hemmung der Lymphozytenproliferation durch Apoptoseinduktion und das Ausmaß der Zellzyklus-Arretierung waren mit Methotrexat vergleichbar. LC-MS-Analysen zeigten, dass der Extrakt verschiedene Quercetin-Glycoside enthält.

¹⁾ 'Ein wässriger Extrakt von Betula pendula-Blättern hemmt das Wachstum und die Teilung von aktivierten Lymphozyten'; C. Gründemann et al; Journal of Ethnopharmacology 136 (2011) 444-451

Musteranforderung

(gem. §47 Arzneimittelgesetz)

Betula Folium D3 Bitte senden Sie mir ein Muster Ihres Arzneimittels.

Bitte senden Sie mir den Artikel:
'Ein wässriger Extrakt von Betula pendula-Blättern hemmt das Wachstum und die Teilung von aktivierten Lymphozyten'.

abnobaVISCUM® Bitte senden Sie mir auch Informationen zur onkologischen Mistel-Therapie (Rezidivprophylaxe, adjuvante und palliative Therapie).

Bitte geben Sie ihre Berufsbezeichnung gem. §47 Arzneimittelgesetz an.

Vorname

Name

Strasse

PLZ/Ort

Datum:

Unterschrift:

